DEMANDE D'EXAMENS MICROBIOLOGIQUES :

BACTERIOLOGIE – VIROLOGIE – MYCOLOGIE – PARASITOLOGIE

❖ Ce document est consultable dans le manuel de prélèvement - CHAN.MICRB.PRE.DE.001.01

NOM : Nom de naissance : Date : Heure :
 Prénom : Date de naissance : Préleveur :
 Service : Sexe : Prescripteur :

Renseignements cliniques : URGENT : OUI NON

Traitement préalable / en cours ?

LIQUIDE CEREBROSPINAL LCR :

(Tubes coniques stériles numérotés)

- Cytochimie-bactériologie **LCR** min 3 mL (3 tubes)
 PCR Multiplex **LCRFA** min 0,3 mL (1 tube)

Examens transmis : URGENT TAXI

- PCR EBV **EBVBM** 0,5 mL
 Borréliose (Lyme) : **BORPL + BORBM**
 - PCR Lyme 0,5 mL
 - Synthèse intra-thécale 1 mL
 + sang (tube jaune)
 BK : examen direct / culture **BK** 0,5 mL
 BK PCR compl. Tuberculosis **BKBM** 0,5 mL
 Immunoélectrophorèse **EPLCR** 1 mL
 + sang (tube jaune)

- Bilan MCJ* **MCJ**
 Bilan Alzheimer* **ALZH**
 Néoptérine* **NEOPL**

*(Tubes spécifiques à demander au laboratoire + joindre fiche de renseignement)

LIQUIDE DE PONCTION :

(Tubes coniques stériles ou poudriers + **1 tube EDTA**)

- Liquide pleural **PLEUR**
 Liquide d'ascite **ASCI**
 Liquide de dialyse péritonéale **DPCA**
 Liquide articulaire **ARTI**

Localisation :

- Liquide de ponction prélevé sur hémoculture
 (1 paire) **HEMLP**

Nature :

Examens transmis :

- PCR ARN 16S (universelle) **PCUNI**

MYCOLOGIE DE LA PEAU ET DES PHANERES

Utiliser un bon spécifique : BIO/FOR/0030

HEMOCULTURES ADULTE :

Renseignements cliniques :

- Bilan d'un syndrome infectieux (5 jours)
 Suspicion d'endocardite (14 jours)

Hémoc. Périphériques :

- 2 flacons **HEMO1** 4 flacons **HEMO4** 6 flacons **HEMO**

Hémoc. sur dispositif intravasculaire :

- VVC VVP KT Artériel KT Dialyse

Autre :

- 2 flacons **HEPA1** 4 flacons **HEPA4** 6 flacons **HEPA**

HEMOCULTURES ENFANT :

- 1 flacon **HEMP1** (nourrisson de - 8 kg)
 2 flacons **HEMP2** (enfant de 8kg à 14 kg)

URINES **ECBU**

(Tube vert avec Borate rempli jusqu'au trait, si QI : poudrier stérile)

Éléments cliniques en faveur d'une infection urinaire :

- Absence de signes Suspicion de pyélonéphrite
 Suspicion de cystite ou prostatite
 Bilan systématique d'un syndrome infectieux

Mode de prélèvement :

- miction 2^{ème} jet collecteur
 sondage évacuateur urine pyélique
 sonde à demeure de moins de 48 h
 sonde à demeure de plus de 48h
 bricker cystocath cystostomie urétérostomie

- Antigénurie Legionella pneumophila **LEGIU**
 Antigénurie pneumocoque (avec accord biologiste) **STPNU**
 Cytologie urinaire (sans culture) **CYTOU**

- Chlamydia/Gonocoque (tube spécial urine/A-50 - 1^{er} jet urines du matin ou après 2 heures de stase vésicale) **PCRCG**

BRONCHOPULMONAIRES :

ECBC – Expectorations : (*poudrier stérile rouge*)
 Cytobactériologie standard **EXPE**

Brossage bronchique : (*tube conique stérile*)
 Cytobactériologie standard **BROSS**

Aspiration bronchique :
 Cytobactériologie standard **FIBR**
 Recherche d'Aspergillus/mycologie **ASPER**

LBA :
 Cytobactériologie standard (5mL) **LBA**
 Recherche d'Aspergillus/mycologie **ASPER**

Examens transmis : URGENT TAXI
 PCR Herpes (1 mL) **HERBM**
 PCR CMV (1mL) **CMVBM**
 PCR Legionella (1 mL) **LEGBM**
 BK : examen direct/culture (*dont mycobactéries atypiques*) (1mL) **BK**
 BK PCR compl. Tuberculosis (1 mL) **BKBM**
 Nocardia : PCR/culture (1 mL) **NOCAR**
 PCR Pneumocystis : PCR/ED (1mL) **PCAR**

SELLES : (*Kit de prélèvement Fecal Swab bouchon vert, l'écouvillon ne doit pas être trop chargé*)

Aspect des selles : Liquides Purulentes
 Molles Normales

Rens. Cliniques :
 Absence signes cliniques Syndrome infectieux
 Diarrhée aiguë (>3 selles/24h) Diarrhée chronique
 Diarrhée chez immunodéprimé TIAC

Prise d'antibiotiques récente ?

Panel Gastro-entérites **DGEI**
 Clostridium difficile **BDCLO**

Autres demandes : Parasitologie des selles **PARSP**
 (*pot stérile rouge + fiche de renseignement parasito*) Recherche de sang **SGK**

DEPISTAGE :

Dépistage BMR (SAMR + BLSE) **EPIID** :
 o *Narines : un seul ecouvillon Eswab bouchon rose*
 o *Anus : un seul ecouvillon FecalSwab bouchon vert*

Dépistage BHRé : ERV **ERV** EPC **CARB**
un seul écouvillon FecalSwab bouchon vert

ORL-ŒIL : (*écouvillon Eswab rose ou orange*)

Gorge **GORGE** Nez **NEZ** Oreille **OREIL**
 Œil **ŒIL** Sinus **SINUS**

Préciser : droit (e) gauche

Examens transmis :
 PCR Coqueluche (*Kit coqueluche + fiche de renseignements*) **COQBM**

IOA : Infections Ostéoarticulaires IOA

Rens. cliniques :

Localisations :
 Site 1 : Site 2 :
 Site 3 : Site 4 :
 Site 5 : Site 6 :

Prélèvement profond (*plaie profonde, abcès, digestif profond, adénopathie,...*)
 (*poudrier, seringues bouchée, écouvillon Eswab bouchon rose*) **PRLPR**

Localisation précise :

Modalités de prélèvements :

Prélèvement superficiel (*plaie superficielle, furoncle, érysipèle, ulcération, morsure, ...*)
 (*poudrier, seringues bouchée, écouvillon Eswab bouchon rose*) **PRLSP**

Localisation précise :

Modalités de prélèvements :

MATERIEL : (*poudrier*) **MATER**

Rens. Cliniques :

Type/Localisations :

CATHETERS : (*extrémité distale du cathéter en poudrier stérile*) **KT**

Localisation :

CHAMBRE IMPLANTABLE **CHIP**

STERILET : (*poudriers*) **STERI**

Rens. Cliniques :

PRELEVEMENT Génital (*écouvillon Eswab rose*)

PV standard **PV** PV 8^{ème} mois **PV8**
 Sphère Génital Divers **SPHGD**

Localisation :

PCR Chlamydia / gonocoque (*écouvillon SWAB/A-50*) **PCRCG**
 PCR Herpes (*kit Herpes*) **HERBM**

Localisation :

AUTRES EXAMENS :

.....